

Fertőző betegségek elleni védekezési program

Minden telepre bekerülő 3 hónaposnál idősebb állatot még a kennelben való elhelyezés előtt élő, attenuált kombinált vakcinával oltunk. Ez a vakcinázás szopornyica, adenovirozis, parvovirozis, parainfluenza 2. típus okozta légzőszervi fertőzései, Leptospira canicola és Leptospira icterohaemorrhagiae okozta leptospirosis és veszettség ellen biztosít védelemet. A Telepre bekerülő 6 hetesnél idősebb, de 3 hónaposnál fiatalabb állatok pedig veszettség nélküli kombinált vakcinával kerülnek beoltásra.

Minden felső légúti tüneteket mutató állatot a tünetek megjelenésekor ill. minden Telepről kikerülő állatot, melyeknél a vakcinázás és az eladás között kevesebb mint 3 hét eltelt polivalens, homológ szérummal (BODYGLOB) látunk el. Az a kutya, amelyik 3 hétnél hosszabb ideje tartózkodik az Illatos úton, kikerülésekor nem kap szérumot, mivel ezen időszak alatt már a vakcina kiváltotta ellenanyag olyan szintet ér el, ami biztos védelemet biztosít.

A vakcina beadását követően kialakuló ún. negatív fázis (0.-5.nap) ideje alatt, amíg a vakcina indukálta ellenanyagtermelés eléri a védelemhez szükséges magas szintet, a kutyák védtelenek, de a szérum folyamatos alkalmazása révén a vírusürítés mértéke egyre inkább csökken, azaz egyre több állat vészeli át fertőződés mentesen ezt a 4-5 napot.

A nagy kutyapopulációkban szinte törvényszerűen előforduló kennelköhögés multifaktoriális betegség, azaz több kórokozó (reovírus, adenovírus, parainfluenzavírus, Bordetella bronchiseptica) együttesen idézi elő, így a kennelköhögés Telepről való teljes eltűnése nem várható, de a szopornyica megszűnése révén a kutya élete nem kerül veszélybe.

A védekezés hatékonyságát 100 állat mintájára (orrváladék, vér, vizelet, tetem) kiterjedő teljes körű diagnosztikai vizsgálat eredményei alapján mérjük le. A diagnosztikai vizsgálatokat az általunk beküldött mintákból a SZIE-ÁOTK Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszékének Diagnosztikai Laboratóriuma végzi.

Összegezve: Bekerülő állat(3 hónál idősebb): kombinált vakcina +veszettség elleni oltás
Bekerülő állat(6 hét- 3 hónap): kombinált vakcina
Beteg állat: szérum+ tüneti kezelés(antibiotikum,infúzió...)
Kikerülő állat: szérum (kivéve, ha több mint 3 hete került a Telepre)+ féregtelenítő

A védekezés részleteit egy szakmai bizottság határozta meg és lebonyolítását, a menet közben felmerülő problémák megoldását ugyancsak ez a testület koordinálja.

A programtól hosszú távon az várható, hogy az Illatos úti kutyák körében előforduló szopornyica vagy teljesen eltűnik vagy pedig szórványossá válik.